

Cápsulas SmartPill pH.p

Información e Instrucciones Importantes para Pacientes

Cómo contactar al médico:

1. La noche anterior a la prueba.

- Deberá ayunar la noche anterior a la prueba. No coma ni beba nada después de la medianoche la noche anterior a la prueba.
- No use productos de tabaco durante el período de ayuno.
- No consuma alcohol 24 horas antes de la prueba y por la duración de la prueba.
- Descontinúe el uso de los siguientes medicamentos:
_____ por _____ días antes de la prueba
_____ por _____ días antes de la prueba
_____ por _____ días antes de la prueba
_____ por _____ días antes de la prueba

2. El día de la prueba

- No coma, beba ni fume nada la mañana antes de ir al consultorio del médico. La prueba con SmartPill incluye una pequeña comida que se le proveerá en el consultorio del médico.
- Si es diabético, tome la mitad de su dosis de insulina de la mañana, a menos que su médico le indique algo diferente.
- Deberá estar en el consultorio del médico a las _____ el día _____.

3. Por la duración de la prueba

- Deberá llevar consigo el receptor de datos en todo momento por la duración de la prueba excepto al bañarse o ducharse. Puede llevar el receptor de datos en un acoollador alrededor del cuello o en un sujetador para cinturón.

PRECAUCIÓN

No se bañe con el receptor de datos puesto; deberá quitarse el receptor de datos al ducharse o bañarse y colocarlo tan cerca de la tina como sea posible.

PRECAUCIÓN

No use el acoollador al dormir.

- No podrá comer por seis (6) horas luego del comienzo de la prueba. Ingerir alimentos durante las primeras seis horas luego de la ingestión de la cápsula afecta los resultados de la prueba. Podrá beber pequeñas cantidades de agua (hasta un total de ½ tasa) durante las primeras seis horas.
- Seis (6) horas después de la ingestión de la cápsula podrá continuar con su dieta regular y uso de tabaco. Podrá continuar su dieta regular a las _____.
- Los pacientes diabéticos deberán vigilar sus niveles de glucosa y obedecer su plan de tratamiento personal. Si tiene alguna duda, deberá contactar a su médico.
- No consuma alcohol hasta haber pasado la cápsula SmartPill.

- Absténgase de usar laxantes, purgantes, medicamentos contra la diarrea y otras medicinas que afectan la motilidad hasta haber pasado la cápsula SmartPill.
- Evite el ejercicio riguroso tal como cuclillas, encogimientos abdominales (crunches) y actividades aeróbicas prolongadas (más de 15 minutos) hasta haber pasado la cápsula SmartPill.
- Durante la prueba, espere por tres (3) minutos en el baño antes de tirar de la cadena del inodoro luego de cada evacuación.
- El receptor de datos contiene un botón rotulado “EVENT” (EVENTO). Presione el botón “EVENT” al hacer una evacuación y anote en su diario la fecha y la hora del evento. Su médico le podría pedir presionar el botón “EVENT” en otras ocasiones:
 Al comer Al levantarse por la mañana
 Al tirarse ventosos Al ir a la cama por la noche
 Al tener nauseas Al hacer cualquier actividad rigurosa
 _____ Al tener dolor o retorcijones
 _____ _____
- Regrese el receptor de datos al consultorio de su médico a las _____ el día _____.

Instrucciones adicionales de su médico:

ADVERTENCIA

No debe someterse a pruebas de MRI si la cápsula SmartPill se encuentra aún dentro de su cuerpo. Lleve consigo la tarjeta de advertencia (a continuación) en todo momento hasta que su médico confirme que la cápsula ha salido.

ADVERTENCIA SOBRE MRI

Estoy haciendo una prueba con SmartPill. SmartPill es un dispositivo con cápsula digerible que me obliga a evitar las pruebas de MRI.

Si tiene alguna pregunta, sírvase contactar a mi médico: _____

() -